


Spikevax (anteriormente COVID-19 Vaccine Moderna)

Almacenamiento y manipulación

Almacenamiento en congelador

Conservar congelada entre
-25 °C y -15 °C.

No conservar en hielo seco o por debajo de -50 °C
Conservar en el embalaje original para protegerla
de la luz.



Descongelar cada vial antes de usarlo

Imágenes del vial solo con fines ilustrativos


2 horas y 30 minutos en la nevera

entre 2 °C y 8 °C
(dentro del periodo
de validez de
30 días a entre
2 °C y 8 °C)



1 hora a temperatura ambiente

entre 15 °C y 25 °C



Dejar el vial a temperatura ambiente durante 15 minutos antes
de administrarlo

Instrucciones una vez descongelado

Vial no perforado

Tiempo máximo

30
días

Nevera

entre 2 °C y 8 °C

24
horas

Almacenamiento
refrigerado hasta
temperatura ambiente
entre 8 °C y 25 °C



Después de la extracción de la primera dosis

Tiempo máximo

19
horas

Nevera o temperatura
ambiente

El vial debe mantenerse a una
temperatura entre 2 °C y 25 °C.
Registrar la fecha y hora de eliminación
en la etiqueta del vial.

Desechar el vial perforado después
de 19 horas.



Extraer del vial cada dosis de 0,5 ml de la vacuna usando una aguja y jeringa estériles nuevas para cada
inyección para evitar la transmisión de agentes infecciosos de una persona a otra.

La dosis de la jeringa debe utilizarse inmediatamente.

**Una vez que se ha producido el pinchazo del vial para extraer la dosis inicial, la vacuna debe utilizarse
inmediatamente y desecharse después de 19 horas.**

Cualquier vacuna no utilizada o residuo debe desecharse de acuerdo con los requisitos locales.

NO volver a congelar una vacuna descongelada

moderna®

Spikevax (anteriormente COVID-19 Vaccine Moderna)

Posología y administración

Posología y calendario

La Spikevax (anteriormente COVID-19 Vaccine Moderna) se administra por vía intramuscular en una serie de **dos dosis** (0,5 ml cada una).

El intervalo recomendado es de 28 días.

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la Spikevax con otras vacunas contra la COVID-19 para completar la serie de vacunación. Las personas vacunadas que hayan recibido una dosis de la Spikevax recibirán una segunda dosis de la Spikevax para completar la serie de vacunación.

Administración

Girar suavemente el vial después de descongelarlo y antes de cada extracción. La vacuna está lista para su uso una vez descongelada. **No agitar ni diluir.**

Antes de la inyección, inspeccionar cada dosis para:

Confirmar que el líquido tiene un color **blanco o blanquecino** tanto en el vial como en la jeringa

Verificar el volumen de la jeringa de **0,5 ml**

La Spikevax puede contener partículas blancas o transparentes relacionadas con el producto.

Si la dosis es incorrecta, o hay un cambio de color y otras partículas presentes, no se debe administrar la vacuna.



Entregar una tarjeta de vacunación a la persona vacunada o a su cuidador con la fecha en que debe regresar para recibir la **SEGUNDA DOSIS** de la Spikevax.

Para preguntas, visite www.modernacovid19global.com y seleccione el país.

INDICACIÓN

La Spikevax está indicada para la inmunización activa para prevenir la presencia de la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 en personas de 18 años o más.

CONTRAINDICACIÓN

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes que se enumeran en la sección 6.1 del Resumen de características del producto

moderna®